

Ad-Soyad:					Tanı: MM						
Yaş/Çinsiyet:					Tedavi: Otolog KİT ☐ / Allojenik KİT ☐						
VYA(m ²):		Boy(cm):		Kilo(kg):	M. Musso et al. / Biol Blood Marrow Transplant 21 (2015) 1932–1938						
Tedavi günleri	Antineoplastikler				G-CSF 5-10 µg/kg/gün	Antimikrobiyal profilaksi					Tedavi günleri
	Tarihler	Thiotepa 275 mg/m ² /günmg/gün	Melphalan 140 mg/m ² /günmg/gün			Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 PO	Ürikoliz 1x 300 mg	
-6						+	+	+		+	-6
-5		X				+	+	+	+	+	-5
-4						+	+	+		+	-4
-3						+	+	+		+	-3
-2			X			+	+	+		+	-2
-1						+	+	+		+	-1
0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU										
+1					+	+	+	+		+	+1
+2					+	+	+	+			+2
+3					+	+	+	+			+3
+4					+	+	+	+			+4
+5					+	+	+	+			+5
+6					+	+	+	+			+6
+7					+	+	+	+			+7
+8					+	+	+	+			+8
+9					+	+	+	+			+9
+10					+	+	+	+			+10
+11					+	+	+	+			+11
+12					+	+	+	+			+12
+13					ANC ≥1.0 x10 ⁹ /L (2 gün)	+	+	+			+13
+14						+	+	+			+14
+15						+	+	+			+15
+16						+	+	+			+16
+17						+	+	+			+17
+18						+	+	+			+18
+19						+	+	+			+19
+20						+	+	+			+20
+21						+	+	+			+21

*Busulfan 60 yaş üzeri 4x0.6mg/kg/gün dozunda uygulanır.

ERİŞKİN KÖK HÜCRE NAKİL ÜNİTESİ

THIO/MEL OTOLOG/ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK REJİMİ ORDER FORMU

Hasta Adı-Soyadı:

Tarih:

Boy:

Kilo:

Vücut yüzey alanı:

İdeal vücut ağırlığı:

ORDER

D-6: Tarih:.....

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO₃ + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Ürikoliz tablet (300 mg): 1×1 tablet
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x1 kapsül

Hasta Adı-Soyadı:

D-5: Tarih:.....

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO₃ + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Ürikoliz tablet (300 mg): 1×1 tablet
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x1 kapsül
- 10.00: **Thiotepa** 275 mg/m²/gün (toplam.....mg) 500 ml % 0.9NaCl içerisinde 3 saatte
IV infüzyon şeklinde uygulanır.

Hasta Adı-Soyadı:

D-4: Tarih:.....

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO₃ + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Ürikoliz tablet (300 mg): 1×1 tablet
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x1 kapsül

Hasta Adı-Soyadı:

D-3: Tarih:.....

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO_3 + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Ürikoliz tablet (300 mg): 1×1tablet
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x1 kapsül
- Bactrim fort tablet (800/160 mg) : 2×1 tablet

Hasta Adı-Soyadı:

D-2: Tarih:.....

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO₃ + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Ürikoliz tablet (300 mg): 1×1 tablet
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x1 kapsül
- Hidrasyon (Melphalan öncesi): (I)1.000 ml 0.9% NaCl + 20 mmol KCl **6 saatte** uygulanır; Takiben
(II) 1.000 ml 0.9% NaCl + 10 mmol KCL **60 dakikada** uygulanır
- Furosemide: Hidrasyondan 30 dakika sonra 20-40 mg IV bolus uygulanır
- 10.00: **Melphalan:** Toplam.....mg 250 ml 0.9 NaCl içerisinde **15- 30 dakikada** infüzyon.
- **Melphalan infüzyonundan 5 dakika önce başlayarak infüzyon tamamlanana kadar ağızda buz gezdirilir.**
- Hidrasyon (Melphalan sonrası):
(I). 1.000 ml 0.9% NaCl + 10 mmol KCl **2 saatte** uygulanır; Takiben
(II). 1.000 ml 0.9% NaCl + 10 mmol KCl **4 saatte** uygulanır; Takiben
(III). 1.000 ml 0.9% NaCl + 20 mmol KCl **6 saatte** uygulanır.
- Sıvı yüklenmesinden kaçınılmalı, aldığı-çıkardığı yakından takip edilmeli, gerekirse furosemid yapılmalıdır

Hasta Adı-Soyadı:

D-1: Tarih:.....

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO₃ + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Ürikoliz tablet (300 mg): 1×1 tablet
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x1 kapsül

Hasta Adı-Soyadı:

D0: Tarih:.....

"Kök hücre infüzyonunun yapıldığı tüm günler D0 kabul edilir"

- **İdame sıvısı:** (% 5 Destroz % 0.2 NaCl 500 ml + 1/2 amp NaHCO₃ + 1 amp KCl):
.....ml/saat,ml/gün
- Valtrex tablet (500 mg): 1×1 tablet
- Avelox tablet (400 mg): 1×1 tablet
- Flukanazol kapsül (200 mg): 2 x2 kapsül

UYARILAR

- (I). Toplanan kök hücre ışınlanmaz.
- (II). Kök hücre hastaya verilirken infüzyon pompası veya lökosit filtresi kullanılmaz.