

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ ALLOJENİK "Treosulfan/Fludarabine/ATG" PROTOKOLÜ

Ad-Soyadı:		Tanı:		Boy:		Kilo:		VYA:											
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D-7'ile D+12. Günler)																	
		Antineoplastikler			Antimikrobiyal profilaksi				GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar					Günler			
		Treosulfan 10 gram/m ² /güngram/gün	Fludarabine 30 mg /m ² /günmg/gün	ATG-Fresenius (Grafalon) 5-10 mg /kg /gün	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Posakonazol 3 x 200 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Metotreksat	G-CSF 5 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	IVIG 100 mg/kg			Ursofalk 3 x 250 mg tb	ATEŞ C°	
D-7					+	+	+		+	D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 4 gün uygulanır. (D+1, D+3 D+6 ve D+11. günlerde) IV olarak uygulanır.		+		+		D-7		
D-6			+		+	+	+	+	+			+	+		+		+		D-6
D-5			+		+	+	+	+	+				+		+		+		D-5
D-4		+	+	+	+	+	+	+	+				+		+		+		D-4
D-3		+	+	+	+	+	+	+	+				+		+		+		D-3
D-2		+	+	+	+	+	+	+	+			+	+		+		+		D-2
D-1					+	+	+	+	+			+	+	+	+		+		D-1
D 0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU			+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	D 0
D+1					+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	D+1
D+2					+	+	+	+	+			+	+	+	+		+	+	D+2
D+3		Parenteral antibiyotikler			+	+	+	+	+			+	+	+	10 mg/m ²			+	D+3
D+4					+	+	+	+	+			+	+	+				+	D+4
D+5					+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	D+5		
D+6					+	+	+	+	+	+	+	+	10 mg/m ²	+		+	D+6		
D+7					+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	D+7		
D+8					+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	D+8		
D+9					+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	D+9		
D+10					+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	D+10		
D+11					+	+	+	+	+	+	+	+	10 mg/m ²	+		+	D+11		
D+12					+	+	+	+	+	+	+	+		+		+	D+12		