

Ad-Soyadı:	Tanı: AML-MDS
Yaş / Cins:	Tedavi: FLAMSA -RIC
VYA:.....m ² (Boy:..... cm, Ağırlık:..... kg)	(1.Sürüm/mart2018)

.SİKLUŞ

Tedavi günleri	Tarih	Antineoplastikler				Profilaksi								ATEŞ C°	
		Fludarabin 30 mg /m ² /gün	Cytarabine 2 g / m ² /gün	Amsacrine 100 mg /m ² /gün	ATG-Fresenius (Grafolon) 5-10 mg /kg /gün	G-CSF 5 mcg /kg/gün	Noxofil süsp 3 x 1 tb	Tavanic 1 x 500mg PO	Acyl tb 3 x 200 mg PO	Göz koruma	Ürikoliz 1x1	sandimmun	Ursactive 3x1	Nidazol 3x1	METEOTORAXAT
-11										+	+				
-10		+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	
-9		+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	
-8		+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	
-7		+	+	+			+	+	+	+	+		+	+	
-6							+	+	+	+	+		+	+	
-5							+	+	+	+	+		+	+	
-4					+		+	+	+				+	+	
-3					+		+	+	+				+	+	
-2					+		+	+	+				+	+	
-1							+	+	+			+	+	+	
0		Toplam mg/gün Fludarabin 100 ml % 0.9 NaCl içerisinde 30 dakikada IV infüzyon olarak uygulanır. (1-4 gün) (İlk önce uygulanır !!!)				KÖK HÜCRE İNFÜZYONU									
+1															
2		Toplammg /gün Cytarabin 500 ml % 0.9 NaCl içerisinde 4 saatte IV infüzyon olarak uygulanır (1-4 gün). (Fludarabinden 4 saat sonra başlanır !!!)					+	+	+			+	+	+	+
3															
4		Toplammg/gün Amsacrine 500 ml dextroz içerisinde 60-90 dakikada IV infüzyon olarak uygulanır. (1-4 gün) (Cytarabineden 2 saat sonra başlanır !!!)					+	+	+			+	+	+	+
5															
6							+	+	+			+	+	+	+
7															
8							+	+	+			+	+	+	+
9															
10							+	+	+			+	+	+	+
11															
12							+	+	+			+	+	+	+
13															
14							+	+	+			+	+	+	+
15															
16							+	+	+			+	+	+	+
17															

Modifikasyon:

Fludarabin: böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Kreatinin klirensi 30-70 ml/dak. Arasında doz %50 oranına kadar azaltılmalıdır. Kreatinin klirensi < 30 ml/dak. Altında ise Fludarabin verilmez.

Cytarabine: Kreatinin klirensi 46-60 ml/dak. arasıdaysa hesaplanan dozun %60, Kreatinin klirensi 31-45 ml/dak. ise % 50'si verilir Kreatinin klirensi < 30 ml/dak. ise Cytarabine verilmez. Bilirubin >2 mg/dL ise cytarabinin 50% verilir. Transaminaz yüksekliğinde hesaplanan cytarabinin dozunun 50%'si verilir.

Amsacrine: Serum creatinine 1.2 to 1.8 mg/dL: No dosage adjustment necessary. erum creatinine 2 to 3 mg/dL, oliguric patients: Reduce dose by 30% to 40%; may increase subsequent dose based on toxicity. Bilirubin >2 mg/dL: Reduce dose by 30% to 40%; may increase subsequent dose based on toxicity.

