

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ İKİNCİ ALLOGENEİK (FLUDARABİN - ATG) KÖK HÜCRE NAKLİ PROTOKOLÜ

Ad-Soyadı:		Tanı: AKUT MYELOİD LÖSEMİ						Boy: cm		Kilo:		VYA: m2									
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D-5 ile D+12. Günler)																			
		Antineoplastikler		Antimikrobiyal profilaksi					GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar					ATEŞ C°	Günler				
		Fludarabin Günde 30 mg/m2 (...mg...)	Antitimosit globulin (ATG) 3 mg/ kg / gün (...mg...)	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Posokanozol 3 x5 ml /gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Metotreksat	G-CSF 10 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	IVIg 100 mg/kg	Ursofalk 3 x 250 mg tb	Parenteral antibiyotikler						
D-5				+	+	+	+	+		D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 4 gün uygulanır. (D+1, D+3 D+6 ve D+11. günlerde) IV olarak uygulanır.		+		+						D-5
D-4				+	+	+	+	+					+		+						D-4
D-3		+		+	+	+	+	+					+		+						D-3
D-2		+	+	+	+	+	+	+					+		+						D-2
D-1				+	+	+	+	+	Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yılda kesilir.		+	+	+		+					D-1	
D 0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU		+	+	+	+	+				+	+	+		+					D 0	
D+1				+	+	+	+	+			+	+	15 mg/m²	±	+		+			D+1	
D+2				+	+	+	+	+			+	+		±			+			D+2	
D+3				+	+	+	+	+		+	+	10 mg/m²	±			+			D+3		
D+4				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+4		
D+5				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+5		
D+6				+	+	+	+	+		+	+	10 mg/m²	±			+			D+6		
D+7				+	+	+	+	+		+	+		±		+	+			D+7		
D+8				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+8		
D+9				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+9		
D+10				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+10		
D+11				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+11		
D+12				+	+	+	+	+		+	+		±			+			D+12		