

Tanı: **APLASTİK ANEMİ**

Boy:

Kilo:

VYA:

Ad-Soyadı:

Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D-10 ile D+12. Günler)														ATEŞ C°	Günler							
		Antineoplastikler				Antimikrobiyal profilaksi					GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar											
		Siklofosamid 50 mg/kg /gün	Mesna 75 mg /kg /gün	fludarabine 30 mg/m ² /gün	Thymoglobulin 2.5 mg/kg/gün	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Posakonazol 3 x 200 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Metotreksat	G-CSF 5 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	IVIG 100 mg/kg			Ursofalk 3 x 250 mg tb						
D-10						+	+	+		+	Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yılda kesilir.	← D +100 kadar devam edilir →	← D +100 kadar devam edilir →	← D +100 kadar devam edilir →	D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 4 gün uygulanır. (D+1, D+3 ,D+6 ve D+11. günlerde) IV olarak uygulanır.		+		+		D-10		
D-9		+	+			+	+	+		+								+		+		+		D-9
D-8		+	+			+	+	+	+	+								+		+		+		D-8
D-7		+	+			+	+	+		+								+		+		+		D-7
D-6		+	+			+	+	+		+								+		+		+		D-6
D-5				+		+	+	+	+	+								+		+		+		D-5
D-4				+		+	+	+		+								+		+		+		D-4
D-3				+	+	+	+	+		+								+		+		+		D-3
D-2				+	+	+	+	+	+	+								+		+		+		D-2
D-1					+	+	+	+		+								+		+		+		D-1
D 0		KÖK HÜCRE İNFÜZYONU				+	+	+		+							+					+		D 0
D+1						+	+	+		+								+	+	15 mg/m ²	±		+	
D+2						+	+	+		+		+	+		±		+		D+2					
D+3						+	+	+		+		+	+	10 mg/m ²	±		+		D+3					
D+4						+	+	+		+		+	+		±		+		D+4					
D+5		Parenteral antibiyotikler				+	+	+		+		+	+		±		+		D +5					
D+6						+	+	+		+		+	+	10 mg/m ²	±		+		D+6					
D+7						+	+	+		+		+	+		±		+	+	D+7					
D+8						+	+	+		+		+	+		±		+		D+8					
D+9						+	+	+		+		+	+		±		+		D+9					
D+10						+	+	+		+		+	+		±		+		D+10					
D+11						+	+	+		+		+	+	10 mg/m ²	±		+		D+11					
D+12						+	+	+		+		+	+		±		+		D+12					