



ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ ALLOJENİK RIC (Fludarabine-Melphalan) PROTOKOLÜ

Ad-Soyadı:				Tanı:				VYA (m ²):		Kilo(kg):		Boy(cm):												
İlaç uygulamaları (D-7 ile D+12. Günler)																								
Günler	Tarih	Antineoplastikler				Antimikrobiyal profilaksi				GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar				Günler								
		Fludarabine 25-30 mg/m ² /günmg/gün	Melphalan 50-70 mg/ m ² /günmg/gün	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Levofloksasin 1 x 500 mg/gün	TMP/SMX 2X1 fort tb.		Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Post CY	G-CSF 5 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	Ursofalk 3 x 250 mg tb		ATEŞ C°									
D-7				+	+	+	+	+	+	D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 25-50 mg/kg uygulanır. (D+3 ve D+4 ve günlerde) IV olarak uygulanır.		+	+		D-7								
D-6		x		+	+	+	+	+	+					+	+		D-6							
D-5		x		+	+	+	+	+	+					+	+		D-5							
D-4		x		+	+	+	+	+	+					+	+		D-4							
D-3		x	x	+	+	+	+	+	+					+	+		D-3							
D-2		x	x	+	+	+	+	+	+					+	+		D-2							
D-1				+	+	+	+	+	+					+	+		D-1							
D 0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU			+	+	+	+	+	+					+	+		D 0							
D+1				+	+	+	+	+	+	Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1 . yılda kesilir.							D+1							
D+2				+	+	+	+	+	+															D+2
D+3		Parenteral antibiyotikler		+	+	+	+	+	+															D+3
D+4				+	+	+	+	+	+															D+4
D+5				+	+	+	+	+	+															D+5
D+6				+	+	+	+	+	+															D+6
D+7				+	+	+	+	+	+															D+7
D+8				+	+	+	+	+	+															D+8
D+9				+	+	+	+	+	+															D+9
D+10				+	+	+	+	+	+															D+10
D+11				+	+	+	+	+	+															D+11
D+12				+	+	+	+	+	+															D+12

(Blood Adv. 2020 Jul 14;4(13):3180-3190)