

ERİŞKİN HEMATOLOJİ KLİNİĞİ Cy/TBI (SİKLOFOSFAMİD /TBI) ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ PROTOKOLÜ

Ad-Soyadı:		Tanı:		Boy:		Kilo:		VYA:									
Günler	Tarih	İlaç uygulamaları (D-7 ile D+12. Günler)															
		Antineoplastikler			Antimikrobiyal profilaksi					GVHD profilaksi		Diğer ilaçlar				ATEŞ C°	Günler
		TBI 12 Gy/3 gün 2x2 Gy/gün	Siklofosamid 60 mg/kg /gün	Mesna 90 mg /kg /gün	Valasiklovir 1 x 500 mg/gün	Flukonazol 1 x 400 mg/gün	Moksifloksasin 1 x 400 mg/gün	TMP/SMZ 2X1 fort tb.	Metronidazol 3x500 mg tb./gün	Siklosporin (iv) 2 x1.5 mg/k/gün	Metotreksat	G-CSF 5 µg/kg	Ürikoliz tb 1x1	IVIG 100 mg/kg	Ursofalk 3 x 250 mg tb		
D-7					+	+	+		+	D+31 veya PO alıma kadar IV, sonra PO geçilir ve 2 x3 mg/kg/gün dozunda +180. güne uygulanır	GVHD profilaksisi için 4 gün uygulanır. (D+1, D+3 D+6 ve D+11. günlerde) IV olarak uygulanır.		+		+		D-7
D-6		X X			+	+	+	+	+				+		+		D-6
D-5		X X			+	+	+		+				+		+		D-5
D-4		X X			+	+	+		+				+		+		D-4
D-3			X	X	+	+	+		+		+		+		+		D-3
D-2			X	X	+	+	+	+	+		+		+		+		D-2
D-1					+	+	+		+		+		+		+		D-1
D 0	KÖK HÜCRE İNFÜZYONU				+	+	+		+		+		+	+	+	+	D 0
D+1					+	+	+	Engrafman sonrası tekrar başlanarak posttransplant 1. yılda kesilir.	+		+	15 mg/m²	±	+		+	D+1
D+2					+	+	+		+	+		±			+		D+2
D+3		Parenteral antibiyotikler			+	+	+		+	+	10 mg/m²	±			+		D+3
D+4					+	+	+		+	+		±			+		D+4
D+5					+	+	+		+		±			+		D+5	
D+6					+	+	+		+		+	10 mg/m²	±			+	D+6
D+7					+	+	+		+		+		±		+	+	D+7
D+8					+	+	+		+		+		±			+	D+8
D+9					+	+	+		+		+		±			+	D+9
D+10					+	+	+		+		+		±			+	D+10
D+11					+	+	+		+		+	10 mg/m²	±			+	D+11
D+12					+	+	+		+		+		±			+	D+12